

Overschakelen, malen en fokken

Overschakelen naar rauwe voeding

Het voeren van rauwe, vlezige botten verricht wonderen ten gunste van de gezondheid van honden. Maar het begin, het overwinnen van je angsten, kan een zenuwslopende bezigheid zijn. We hebben allemaal wel eens negatieve berichten in de media gelezen over honden die stikken in botten, de dierenartsrekeningen geassocieerd met darmperforaties en slechte bacteriën waarvan gezegd wordt dat ze zich schuilhouden in elke hap rauwe voeding. We willen onze huisdieren ook maar niet een béétje kwaad doen. Daarbij hebben we een zelfbeeld dat we moeten behouden. We willen niet roekeloos overkomen, conventies bespotten en openstaan voor spot.

Wees gerust, veeg het zweet van je voorhoofd en droog je handpalmen. Het menu van je huisdier omschakelen is het belangrijkste wat je kunt doen om gezondheid, vitaliteit en levensduur te bevorderen. Gelukkig staan de meeste honden in contact met hun innerlijke wolf en zullen ze het eerste sappige bot pakken dat je ze aanbiedt. Sommige honden echter, verslaafd zijnde aan het commerciële aanbod, hebben misschien wat overtuiging nodig.

Laten we aannemen dat je hond nog relatief jong is, geen grote/pijnlijke problemen heeft met zijn tanden en tandvlees (zie hoofdstuk 7) en tot nu toe commercieel of een thuis gekookt menu gevoerd heeft gekregen. De eerste vraag is dan: voer je de veranderingen geleidelijk door of schakel je het menu abrupt over?

Ik beveel je aan dat je, wanneer het mogelijk is, je een complete verandering doorvoert, zonder opbouw. Stop gewoonweg met het oude menu en start met het nieuwe. In het begin is de beste aanpak één voedselsoort te kiezen en daarbij te blijven totdat ze succesvol omgeschakeld zijn. Hele kippen of kippenruggen en –skeletten maken een aantal goede beginners maaltijd voor alle formaten honden. Gooi de onderdelen simpelweg op de grond en kijk naar je hond die snuift, likt en uiteindelijk toehapt. Je zou de behoefte kunnen voelen te gaan zweven bij de eerste paar voedingssessies. Probeer van op een afstand te zweven om niet opdringerig over te komen bij je hond.

Na ongeveer een week van kip of ander gekozen voedsel te hebben verstrekt, en vooropgesteld dat er geen spijsverteringsproblemen zijn, dan kun je een variëteit van andere grote, rauwe, vlezige botten en karkassen introduceren. Sta ongeveer een week toe om een nieuw soort voedsel te introduceren voordat je overgaat op de volgende.

Wat als je hond verslaafd is aan junk food en wat als jij gewend bent aan het voeren van die verslaving? Vaak maakt een vastenperiode van 24 uur een groot verschil. Weersta de verleiding om een snack van brok of ingeblikt moes te geven. Verwijder simpelweg al het voer gedurende 24 uur. De volgende dag zal je wat verwarde en hongerige hond meer gewillig zijn om het nieuwe, vreemde, aangeboden te onderzoeken. Als deze strategie faalt, moeten we opnieuw gaan nadenken.

Moeilijke honden overschakelen

Sommige mensen voelen hun maag draaien bij de geur, of zelfs de gedachte, aan een bepaald voedsel. Voedselaversie treft honden ook. Bijvoorbeeld als een hond gestoken wordt door een bij op het moment dat hij / zij een kipkarkas eet, of buikpijn krijgt op dat moment van het eten van die kipkarkas, dan wordt die pijn geassocieerd met die kippenmaaltijd, dan kan het resultaat aversie van kip zijn. Algemeen beschouwd is het echter geen *slechte* ervaring maar gebrek *aan* ervaring die honden nieuwe smaken en texturen doet weigeren.

Het overschakelen van moeilijke honden zou wat vindingrijkheid kunnen kosten waarbij je een combinatie van methoden gebruikt. Net zoals wolven, kunnen honden verbazingwekkend goed honger aan. Het is niet onaardig om honger je belangrijkste gereedschap te laten zijn. Dikke honden kunnen zelfs voor langere perioden vasten zonder ziekteverschijnselen - zelfs verscheidene weken. Magere honden kunnen ook voor langere perioden zonder voedsel. Maar twee of drie dagen zonder porties werkt meestal gewoon goed. Als de kippenskeletten niet gegeten zijn na een uur, leg ze dan in de koelkast tot de volgende dag. Na een dag of drie zal je hongerige hond je overal volgen - en een gewillige deelnemer zijn in het experiment.

Komt je hond af op het rammelen met droge brokken? Houd je hond ervan smakelijke hapjes te vangen, of een bal op te halen? Een beetje plagen en misleiding, omwille van eervolle doelen, zouden de truc kunnen zijn. Rammel met de bak, maar gooi er kleine stukjes vlees in. Je zou kunnen proberen wat kippenvlees in stukjes te snijden en het te mixen met het bekende voedsel; geleidelijk aan de proporties kip te verhogen gedurende een paar dagen en het dan te vervangen door grotere stukken kip aan bot. Je zou kunnen proberen blikvoeding of gemalen brokken op rauwe botten te smeren.

Heb je een kleine hond die je gekookte menselijke voeding geeft? Sommige kleine honden zouden hun kip *licht* gegrild willen hebben. Grill het vlees na een introductieperiode en minder tot het moment dat het geheel rauw is. Wanneer je hond het idee heeft dat rauw vlees goed smaakt, zal hij of zij snel vreugde scheppen in het scheuren van vlees en het kraken van botten. De aanhouder wint. Geef niet op bij kleine honden. Rauwe voeding is essentieel voor hen. Ze hebben méér tandenreiniging nodig, niet minder.

Als een hond eenmaal geniet van de smaak van rauwe kip, dan is de geleidelijke overgang naar rauwe, vlezige botten en slachtafval meestal ongecompliceerd. Hoe het ook zij, wanneer een nieuw onderdeel weerstand oproept, probeer dan een paar dagen te vasten. Ik wens je succes toe en ik noem een aantal uitzonderingen - rauw voeren is geen mechanisch proces, we moeten voeling blijven houden met de realiteit van de natuur. Er zijn honden die nog liever verhongeren dan te eten wat anders gezond, natuurlijk voedsel is.

Sommige honden genieten van rauwe vis en sommige honden weigeren vis te eten, hoe hard je het ook probeert. Mijn eigen honden eten kippenruggen en - skeletten met geestdrift. Maar tot mijn ergernis, toen ik wat oude leghennen kocht, met de intentie ze warm, bevederd en met ingewanden en al te voeren, pakte ze de vers geslachte hennen met een krachtige schudbeweging aan - er zorg voor dragend dat de hennen dood waren - maar weigerden resoluut ze te eten. Ik probeerde de hennen te plukken, te ontdoen van hun ledematen, ik probeerde alles wat ik kon bedenken, maar de hennen bleven onaangeroerd. Zo is het leven met honden.

De overgebleven hennen leefden nog lang en gelukkig en legden heel wat eieren om dat te bewijzen.

Voedsel malen, is het nodig?

Door het trekken en scheuren aan voedsel houden carnivoren periodontale en daarmee geassocieerde ziekten op een afstand. Als je de tandenreinigende functie weghaalt, ontnem je een groot voordeel van rauw voedsel. Je zou geen medicijn kopen dat aangelengd is met water voor een goedkopere prijs, voor je kinderen, en op dezelfde wijze is het geen goed beleid de gezondheidsvoordelen van rauwe voeding te laten verwateren.

Maar in overweging nemend dat we te maken hebben met complexe, biologische systemen, dan is het heel af en toe nodig dat we de regels aanpassen. Voor korte tijdsperioden kunnen carnivoren perfect overleven zonder bot in hun menu. Dus als een huisdier te jong of te ziek is om hele, rauwe, vlezige botten te eten, dan is het antwoord simpel - voer gesneden of gemalen vlees en slachtafval (maar onthoud: dit is alleen voor een korte tijdsperiode).

Voordat pups drie weken oud zijn hebben ze geen vast voedsel nodig en na zes weken hebben ze tanden om aan hele stukken voedsel te trekken en te scheuren. Gedurende de overgangsfase van melk naar hele stukken voedsel, geven wolvenmoeders deels verteerde maaginhoud over voor hun pups. Alleen een paar gedomesticeerde honden geven voedsel over op deze manier. Als de hond genoeg melk heeft en het nest klein is, dan zal extra voeren wellicht niet nodig zijn. Maar als je twijfelt, geef dan fijn gehakt of gemalen rauw vlees met kippenstukjes. Op de leeftijd van zes weken blijken de meeste pups een voorkeur te geven aan voedsel dat trekken en scheuren vereist, en dan zou het voeren van gemalen voedsel beëindigd moeten worden.

Voor het voeren op lange termijn van oude en tandenloze honden zou het voedsel misschien gemalen moeten worden. Maar ik zeg "misschien". Zelfs tandenloze of bijna tandenloze honden kunnen op hun tandvlees door kippenskeletten heen komen. Zij hebben baat bij de mentale en fysieke oefening en versterken het tandvlees. In de laatste weken van zijn leven zal een bejaard huisdier misschien assistentie nodig hebben bij het eten. Gemalen of gesneden vlees en slachtafval werkt hier goed. In een laat stadium van het leven en voor een korte periode, hoef je niet strikt vast te houden aan de botbehoefte in het menu.

Dus wanneer hebben volwassen honden gemalen, rauwe, vlezige botten nodig?

Er is een zeldzame gezondheidstoestand, mega-oesophagus, die effect heeft op de mogelijkheid van een dier voedsel aan de maag te leveren, met als resultaat dat het voedsel samengevoegd wordt in de slokdarm. Fijn gemalen voedsel zou dan aangeboden moeten worden. Een zeldzame toestand van honden, pylorische stenose, zou kunnen voorkomen dat voedsel van de maag naar de dunne darm passeert. Een operatie kan meestal het probleem oplossen, maar totdat de operatie verricht is, is het best om het voedsel te malen.

Fokken

Laat de natuur onze gids zijn. Laat het kweekseizoen samenkomen met een goed aanbod van geschikt voedsel. Ja, zo eenvoudig is het. Wilde carnivoren planten zich voort op hetzelfde moment dat er een maximum aantal aan eenvoudig te vangen jonge prooidieren is.

Voer je fokdieren op een wijze die zo dicht mogelijk bij de natuurlijke manier van voeren aansluit en ze zullen optimale vruchtbaarheid hebben, foetussen zullen de volledige draagtijd uitdoen en het geboorteproses zal zo ongecompliceerd mogelijk verlopen zoals het in alle redelijkheid kan verwacht worden.

De redenen hiervoor zijn duidelijk als we ophouden eraan te denken. Gezonde mannetjes hebben gezond sperma en gezonde vrouwtjes leveren gezonde eitjes. Een gezonde baarmoeder creëert de beste omgeving voor groeiende embryo's, een sterke baarmoeder en buikspieren geven de beste kans voor een probleemloze geboorte.

Fokkers melden minder keizersneden bij dieren die rauw gevoerd zijn, in tegenstelling tot diegene die bewerkte voeding kregen. Pasgeboren pups en kittens neigen wat kleiner te zijn, maar krachtiger dan de slaperige nakomelingen van moeders die bewerkt voedsel kregen. Pups en kittens die zogen stimuleren het melkaanbod en de samentrekkingen van de baarmoeder krachtiger, wat op zijn beurt het welbevinden van de moeder verzekert. Gezonde moeders likken en wassen hun nakomelingen om de moederband te versterken en circulatie, ademhaling en de afscheiding van urine en uitwerpselen te stimuleren bij de jongen.

Carnivoren moeders "ruimen op" bij hun nakomelingen. Het intrigeerde me dat het "opruimen" langer duurt bij nesten die rauw gevoerd worden. Geen vieze geurtjes en karakteristieke troep van welpen zoals je ze vind in met bewerkte voeding gevoerde nesten.

Op de leeftijd van drie weken is de tijd gekomen om te beginnen met het geven van hele stukjes rauwe voeding. Kippenruggen en -skeletten zijn een goed eerste keus op voorwaarde dat er veel vlees aan de botten zit. De jongen zuigen eerst en rukken dan aan het vlees en op de leeftijd van zes weken kraken ze de zachte kippenbotten. Hele konijnen en vissen zijn een andere goede bron van voedsel voor jonge dieren. Hou alsjeblieft in gedachten dat pups vlot een scala aan soorten voedsel tot zich nemen. Introduceer vroeg een grote verscheidenheid aan rauwe, vlezige botten en karkassen en je huisdieren zullen opgroeien met een brede waaier aan smaak.

Supplementen

Zwangere vrouwen krijgen frequent extra ijzer en foliumzuur voorgeschreven. Maar voor zwangere carnivoren is er geen behoefte aan extra's. Voer gewoon hele karkassen of rauwe, vlezige botten en tafelresten. In feite kan het toevoegen van mineralen en vitaminen schadelijk zijn.

Moederloze pups moeten melk gevoerd krijgen. Als je geluk hebt zal je een pleegmoeder kunnen vinden die de wezen zou willen accepteren als haar eigen kroost. In het tegenovergestelde geval zijn er goede kunstmatige melkproducten verkrijgbaar bij dierenartsen en dierenspecialisten. Onthoud alsjeblieft dat carnivoren moeders hun nakomelingen likken, die dan urineren en ontlasten op die tong van hun moeder. Het is belangrijk dat je deze handelingen imiteert na een voedingssessie. Maar je hoeft je tong niet te gebruiken! Ik adviseer een vochtig gemaakt wattenbolletje of een papieren zakdoekje, dat werkt goed.

Zoals eerder gezegd, zouden pups van de leeftijd van drie tot zes weken extra voeding nodig kunnen hebben met fijn gesneden of gemalen voedsel. Fijn gehakt voedsel van kip, vis, konijn of mager rundvlees werkt goed. Voorzie een constante voorraad van karkassen of

kippenskeletten gedurende deze periode van extra voeren. Zodra pups gewend zijn aan het trekken en scheuren, stop je met gemalen of gesneden vlees.

Opgroeiende pups hebben veel calcium in hun menu nodig om de groei van sterke botten te verzekeren. Slachtafval en grote stukken rauw vlees, bijvoorbeeld kopvlees, kan gematigd gevoerd worden. Maar deze voedselonderdelen bevatten weinig calcium. Er is geen noodzaak, en het kan zelfs schaden om calcium - of vitaminesupplementen te geven. Het beste beleid is een natuurlijke bron van calcium te verstrekken: hele karkassen of rauwe, vlezig botten.