

PO Box 6096  
Windsor Delivery Centre  
NSW 2756  
Australia

Tlf.: +61 2 4578-1389  
Fax: +61 2 4578-1384  
E-mail: tom@rawmeatybones.com  
Web: www.rawmeatybones.com

## Fodervejledning til domesticerede hunde og katte

Dingoer og vilde katte holder sig sunde ved at spise hele byttedyr. Ideelt ville det være, om vi fodrede vore kæledyr på samme måde. Indtil en pålidelig leverandør af hele dyr bliver tilgængelig, har kæledyrsejere brug for et tilfredsstillende alternativ. De følgende anbefalinger, baseret på rå kødfulde ben, er taget i brug af tusindvis af kæledyrsejere med fremragende resultater.

Foderplanen er let at følge, den er billig og kæledyrene nyder det.

- Konstant adgang til frisk vand.
- Rå kødfulde ben (eller hele dyr, hvis muligt) bør udgøre grundfundamentet i foderet.
- Tilberedte madrester eller rå (revet eller blendede grøntsager, *undgå tilberedte ben*).

### Hvalpe og killinger

Fra hvalpe og killinger er omkring 3 uger gamle begynder de at få en interesse i hvad deres mor spiser. Omkring seks ugers alderen kan de spise kyllingskrog, kaniner og fisk.

Under den relativt korte periode fra tre til seks ugers alderen tilrådes det at give dem hakket kylling, kyllingskrog eller lignende (ligesom det tilrådes at give dem adgang til større stykker, som de kan rive og flå i). Dette er beslægtet med det delvist fordøjede foder, som deres mor gylper op og som ses hos carnivore (kødædere), der lever i naturen. Store kuld har brug for mere fodersupplement end små kuld. (Kødet og benene bør hakkes sammen. Kød uden ben kan gives, men kun for en kort periode, indtil de unge dyr kan spise kød og ben sammen – normalt, når de er omkring seks uger gamle).

I perioden fra fire til seks måneders alderen vil hvalpe og killinger få deres permanente tænder og vokse hurtigt. På dette tidspunkt har de brug for masser af dyreskrog eller rå, kødfulde ben i passende størrelse.

Hvalpe og killinger har ikke tendens til at overspise, når de fodres med et naturligt foder. Foder kan derfor være frit tilgængeligt.

### Naturligt foder, der er passende til carnivore (kødædende) kæledyr.

#### *Rå kødfulde ben*

- Kyllinge- og kalkunskrog – efter at kødstykkerne til menneskeføde er fjernet - er egnet til hunde
- Fjerkræshoveder, fødder, halse og vinger er kun egnet føde til meget små hunderacer.
- Hele fisk og fiskehoveder
- Ged, får, kalv, hjort og kænguru som hele kroppe kan saves i store stykker af kød og ben
- Andre biprodukter inkluderer: grisetæer, grisehoveder, fårehoveder, bryststykker, haler og ribben

#### *Hele dyr*

Rotter, mus, kaniner, fisk, kyllinger, vagtler og høns.

#### *Indmad*

Lever, lunger, luftrør, hjerte, mavesæk (omasum fra drøvtyggere), mavesæk (rumen fra drøvtyggere).

### **Kvalitet – kvantitet – frekvens**

Sunde dyr, der lever og formerer sig i naturen, er afhængige af at foderet har en korrekt *kvalitet* i den rigtige *kvantitet* med den korrekte *frekvens*. På denne måde opbygges der et af balanceret indtag af næringsstoffer samt den korrekte mængde tandrensning – da dyr, i modsætning til mennesker, ”børster tænder” og ”bruger tandtråd”, mens de spiser.

#### ***Kvalitet***

Vildtlevende dyr med lavt fedtindhold, fisk og fugle er de bedste foderkilder til carnivore (kødædende) kæledyr. Hvis man bruger kød fra landbrugsdyr (kvæg, får, svin) skal man gå uden om fede dyr eller ben, der er for store til at de kan spises.

Hunde er mere tilbøjelige til at knække deres tænder, når de spiser store lårknogler og knogler, der er savet igennem på langs end, hvis de spiser kød og ben samtidigt.

Råt foder til katte bør altid være frisk. Hunde kan konsumere ”modent” foder og vil nogle gange grave ben ned til senere konsumtion.

#### ***Kvantitet***

At opstille en mængde for hvad kæledyr skal have af foder er mere en kunst end en videnskab. Forældre, der bespiser en menneskefamilie, håndterer denne opgave uden hjælp fra næringsstofdiagrammer. Du kan opnå de samme gode resultater for dit kæledyr ved at være opmærksom på aktivitetsniveau, appetit og om dyret er tyndt, tykt eller tilpas.

Høj aktivitet og stor appetit indikerer et behov for øget foderindtag og vice versa.

Kropstilstand afhænger af flere faktorer. Kroppens basale form – er den atletisk eller buttet – og også pelsens glans giver informationer. Brug dine fingerspidser til at vurdere hudens elasticitet. Føles den elastisk og bevæger den sig let hen over musklerne? Føles musklerne spændstige? Og hvor meget huld er der på ribbenene? Dette er det bedste sted at tjekke, hvorvidt dit kæledyr er for tyndt eller for tykt. Ved at sammenligne din egen brystkasse med dit kæledyrs, kan du få en god ide om kroppens tilstand – både din egen og dit kæledyrs.

En gennemsnitlig vejledning til fodermængde til hund og kat, baseret på rå kødfulde ben, er 15-20 % af deres kropsvægt i løbet af en uge eller 2-3 % pr. dag. Hvis en hund vejer 25 kg, vil den have brug for op til 5 kg hele dyr eller rå kødfulde ben på en uge. En kat på 5 kg, vil således have behov for 1 kg kyllingehalse, fisk, kanin eller lignende pr. uge.

Madrester bør fodres som ekstra bestanddel af foderet. Venligst noter dig at disse anvisninger kun er vejledende og relaterer sig til voksne kæledyr i et domesticeret miljø.

Drægtige eller diegivende hundyr, hvalpe og killinger i vækst har måske behov for meget mere mad end voksne dyr med samme kropsvægt.

Hvor som helst det er muligt giv da kød- og benportionen i så stort et stykke, at det giver masser af rivning, flåning og gnavning. Dette giver tilfredse dyr med rene tænder.

#### ***Frekvens***

Carnivore, der lever i naturen, fodres med uregelmæssige intervaller. I et domesticeret miljø, vil regelmæssighed fungere bedst, og derfor vil jeg foreslå at du fodrer voksne hunde og katte en gang om dagen. Hvis du bor i et varmt klima, vil jeg anbefale at du fodrer dine kæledyr om aftenen for at undgå tiltrækning af insekter.

Jeg vil foreslå at du én til to gange om ugen lader din hund faste – ligesom dyr, der lever i naturen.

Lejlighedsvist kan du løbe tør for naturligt foder. Lad dig ikke friste til at købe menneskeskabt kæledyrsfoder, men lad din hund faste og giv rigeligt med naturligt foder den næste dag.

Hvalpe, katte, fritter, syge eller undervægtige hunde bør ikke faste (kun på din dyrlæges anbefaling).

### **Madrester**

Carnivore, der lever i naturen spiser små mængder omnivore (altædende) foder, delvist fordøjet i flydende form, når de spiser tarmene fra deres byttedyr. Vore madrester og lidt frugt og grøntsagsskræller er omnivore foder, som ikke er blevet fordøjet. Forudsat at disse ikke udgør en stor del af foderet, synes de ikke at gøre skade og måske gør de endda en smule nytte. Jeg anbefaler en øvre grænse på 1/3 madrester til hunde og en hel del mindre til katte. At blende madresterne, både tilberedte og rå i køkkenblenderen kan hjælpe til at øge deres fordøjelighed.

### **Ting, der skal undgås:**

- Store mængder kød uden ben – ikke afbalanceret
- Store mængder grøntsager – ikke afbalanceret
- Små stykker ben – kan sluges hele og sidde fast
- Tilberedte ben (kogte, stegte, grillede..) – sætter sig fast
- Mineral og vitamintilskud – skaber ubalance
- Forarbejdet foder – fører til tand- og andre sygdomme
- Store mængder stivelseholdigt foder, fx kartofler og brød – associeret med mavedrejning
- Løg, hvidløg og chokolade – giftigt for kæledyr
- Vindruer, rosiner, sultanas (lille stenfri rosin), solbær, ribs – giftigt for kæledyr
- Frugtkerner (sten) og majscolber – sidder fast i mavesækken
- Mælk – associeret med diarré; dyr drikker det uanset om de er tørstige eller ej og bliver fede; mælk sætter sig klæbende fast på tænder og tankkød

### **Vær forsigtig**

- Ældre hunde og katte, der er vant til forarbejdet foder, kan have begyndervanskeligheder med at skifte til naturligt foder.
- Kæledyr med misdannede kæber og med tandsygdomme kan have svært ved at spise naturligt foder.
- Sørg for variation. Ethvert næringsstof der indtages for meget af, kan være skadeligt.
- Lever er et fremragende foder, men bør ikke gives mere end en gang om ugen.
- Anden indmad, fx komaver, bør ikke overstige 50 % af foderet.
- Hele fisk er en fremragende foderkilde til carnivore, men undgå konstant at fodre med samme fiskeart. Nogle arter, fx Karpe, indeholder enzymer, der ødelægger thiamin (vitamin B1).
- Der er ingen medaljer til den fedeste hund i nabolaget ej heller til den hurtigste hund. Kæledyr skal fodres med livslang sundhed for øje. Forebyggelse er bedre end helbredelse.

### **Diverse tips**

Domesticerede hunde og katte er carnivore. Ved at fodre dem med en for carnivore passende kost repræsenterer det vigtigste bidrag til deres velfærd.

Etabler tidligt i kæledyrets liv kontakt til en pålidelig leverandør af foder til carnivore kæledyr.

Køb storkøb for at undgå mangel.

Pak den daglige ration separat for at gøre fodringen nem.

Køleskabsplads, eller allerbedst: fryseplads, er essentielt.

Rå kødfulde ben kan gives frosne som en is. Nogle kæledyr spiser den frosne mad; andre venter på at det er tøet op.

Små hele dyr, fx rotter, mus og små fugle, kan gives frosne med indmad. Større hele dyr skal have indmaden fjernet før frysning.


Vær opmærksom på at kæledyrene ikke slås om foderet.

Beskyt børn ved at sikre dig at de ikke forstyrrer kæledyr, der spiser.

Madskåle er unødvendige – foderet vil blive trukket hen over gulvet – så det er at foretrække at give foderet udendørs eller på et guly, der er nemt at gøre rent.

Fritter er små carnivore, som kan fodres på samme måde som katte.

For en udvidet beskrivelse af foderbehov, inklusiv de potentielle faldgruber, læs venligst bogen *Raw Meaty Bones: Promote Health* og *Udret mirakler – Giv din hund rå kødfulde ben*.



Yderligere information, links og Raw Meaty Bones (RMB) nyhedsbrev:

**<http://www.rawmeatybones.com>**

VIGTIGT: Vær opmærksom på at individuelle dyr og omstændigheder kan variere. Du kan have brug for at diskutere dine kæledyrs behov med din dyrlæge.

**Denne fodervejledning kan frit kopieres og sendes videre.**

